



庚

**續銀海新編**  
(金五) (姚步石)  
沖和養胃湯——歸脾湯、陽明胃氣散。  
散。四君升柴來返還。歸脾有  
芪朮五味。葛根枳風引過關。  
14 腫痛最大之症  
氣爲起傷成內瘰。初皆如瘰癧  
失光。見一或二成黑花。瞳神  
散。無方。  
狀見瞳神如翳膜。少大些  
許。初不爲意。不過視小  
反大。昏如霧露。空中晶  
花。係腎水漸涸之故。  
千金磁珠丸鎮壓主之。——合  
滋陰地黃湯——氣急怒傷陰  
九。二地參甘補真元。天冬歸  
不寒連翹。地骨五味保自全。  
益陰腎氣丸——益陰腎氣六味  
君。五味柴胡歸尾參。  
調氣湯——瞳神散大實難受。  
國氣湯用柏知母。歸生地陳

(一) 龍步舞

(三)怒氣上逆者 經曰、怒則氣上。又曰、大怒則血逆于上。使人薄厥。况妊娠之婦。血繫于胎。不榮于肝。是以肝氣暴旺。暴則氣逆。血亦隨之。血氣于腦。遂致驟然昏厥而爲癱瘓矣。治宜平肝降逆。用白芍、金匱等藥。

(四)痰濁上逆者 婦人懷孕。腹內氣機。必致阻滯。氣滯則生溼。積滯則生痰。或因腹大而重加束縛。或因惡阻而多食酸膩。以致氣機阻滯。痰涎留滯。甚則上壅于心肺之間。遂爲癰癧。宜順氣化痰。用旋覆代赭等治之。

(五)胎氣上迫者 懷胎八九月。胞胎已大。因胎盤重下口狹小。胎位太高。以致氣不得舒。上逆爲嘔。宜服開胃升下胞衣之藥。使其胎兒早日產下。庶可救也。西醫治此。常用解劑。但不如中醫治法之靈當也。

(元)

逾健婦指痛疾婦解  
徑康女導苦病女決

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 法     | 理     | 各     | 有     | 內     | 本     |
| 不藥治病法 | 久帶急效法 | 虛崩急效法 | 肝氣自療法 | 根本美容法 | 實驗退斑法 |
| 逆學簡便法 | 產後祛瘀法 | 難產催生法 | 通乳神效法 | 暗產避免法 | 臨產預知法 |
| 產前退熱法 | 立門退熱法 | 下胞衣法  | 經期通經法 | 乾血癆治法 | 保赤排色法 |
| 調經養血法 | 乾血癆治法 | 促產急效法 | 背包生治法 | 厚胎    | 一大    |
| 調經生治法 | 乾血癆治法 | 祇收    | 特值    | 一應    | 三馬    |
| 調經生治法 | 乾血癆治法 | 幸福    | 報館    | 發行    | 上海    |

遺精病治療法(十三)

○**對口效方**（戴橋圃）  
烏背鯢魚一個一兩。諸人頭垢三錢。公猪眼梢一對。同煮乾之。

○**搭背隔紙膏**（戴橋圃）  
鉛粉二錢。川茶一錢五分。松花粉二錢。川黃柏二錢。月石二錢。松香二錢白蠟一錢。共研末。作隔紙膏貼。

○**風仙膏**（戴橋圃）  
治對口發背屬陽症者。  
白鳳仙一味。連根花葉清水洗淨。打汁。熬膏敷貼。

○**疥瘡方**（戴橋圃）  
花椒二錢。胡椒炒研。白礬。青黛各二錢。雄黃。硫黃。白礬。黃連各四錢。將白礬黃

蓋嗣而不行者。硬苦。以理處之。則順暢。困思心氣和平。非絕於往日。但未知如此。八九日之無聞斷。又往日間和平多無事之時。今乃能於逆境擺脫。權學之不繼也。故特書於冊。冀日新又新。讀書窮理。從事於敬恕之間。漸進於克己復禮之地。此吾志也。效之速速。非吾敢知。（吳康齊）

侮臥夢寐中。時時驚恐為過時不能學也。（吳康齊）

中堂獨倦。遊後園歸。絲桐三弄。心地悠然。日明風靜。天壤之間。不知復有何樂。（吳康齊）

七月十二夜。枕上思家計露甚。不堪其處。反覆思之。不得其方。日晏未起。久之方得。蓋亦別無巧法。只隨分節用安食而已。聲聲憶家。不敢易初心也。（吳康齊）

貧困中。事務紛至。兼以病瘡。不免時有憤懣。徐散衣冠賣簪。便覺意思通暢。（吳康齊）

濃如秋水食中味。和似春風靜後功。（吳康齊）

力除閒氣固守清貧。（吳康齊）

夜大則屋漏無乾處。吾意浩然。（吳康齊）

（未完）

(李健頤)

自礬一粒。如豆大。用豆衣包而食之。數日後則黃氣自退。按豆性發表。礬性燥溫。一發藥。一燥溫。則邪自解（又方）。取黃連血用熱陳酒沖服。黃色漸退。凡黃疸病。煮黃色藥愈。淡黃色易愈。

○止血散 （陳錫周）  
專治跌打損傷。皮肉破碎。見血疼痛。立刻止痛生肌。應驗如神。刀破出血。能止血效。煨石羔二兩。乳香三錢炒。沒藥三錢炒。血竭二錢。共研細末。雞蛋白調敷患處。或乾豆亦可。

盜汗一症。時醫皆謂爲陰虛。故多用補陰固瀉滑潤之藥。如歸陰散。補陰之藥。正是對症良方。然盜汗亦有因於濕熱者。夫濕熱內蒸。若投以補陰之藥。助勢爲虐。反增其害。豈不悞哉。蓋濕爲水分過多。如衝氣堅固。脾運極密。濕邪無從發泄。變於肌膚。卽爲水腫。衝氣虛散。捍衛無權。濕熱相蒸。熱氣內迫。乘衛虛以外出。爲自汗。衝氣運行於陽。夜行於陰。濕屬陰邪。邪甚相抗。隨衝氣以行於陰。卽爲盜汗。如濕醫所云。水分過多。流溢於靜脈。汗竅開發。水不凝納故也。此症之別。與治陰虛盜汗。有天淵之別。陰虛以補陰爲主。如參耆龜膠阿膠白朮之屬。濕熱以清濕爲本。宜苦芩茯苓沙參麥冬白朮之屬。若陰虛以治濕熱之藥。則陰竭而汗愈甚矣。濕熱以治陰虛之藥。則濕邪泄風。而汗反增矣。差之毫厘。謬若千里。爲醫者。豈可不小心研究乎。然濕熱所興之點。必見小便短赤。舌苔厚滑。脈濡帶數。口不渴。而陰虛之症。則具斯光澤。可以分別之。審證用藥。自不致悞。